

Cáncer de hígado

Entender el cáncer de hígado

Se considera cáncer de hígado aquel que se origina en el hígado. Esto es distinto de encontrar la enfermedad metastásica en el hígado, que se produce cuando otros tipos de cáncer, como el de mama o el de colon, se propagan al hígado. El tipo más frecuente de cáncer de hígado se denomina "carcinoma hepatocelular"; otro tipo llamado "colangiocarcinoma intrahepático" afecta los conductos biliares. Ciertos factores aumentan el riesgo de padecer cáncer de hígado, como la cirrosis, la hepatitis B crónica, el consumo de alcohol, la enfermedad del hígado graso, entre otros. Si tiene riesgo de padecer este tipo de cáncer, el médico podría hacerle pruebas de detección periódicas, como ecografías del hígado y pruebas de alfa-fetoproteína (AFP).

Diagnóstico y estadificación del cáncer de hígado

Los médicos hacen análisis de sangre y pruebas de imágenes, como tomografías computarizadas o resonancias magnéticas, para diagnosticar el cáncer de hígado. Con frecuencia hacen también una biopsia, que consiste en extraer una pequeña muestra de tejido para confirmar el diagnóstico y observar cambios específicos en el cáncer.

Al igual que con otros tipos de cáncer, los médicos tratan de averiguar el grado de extensión o "estadio" del cáncer de hígado. Esto depende del tamaño del tumor, de si hay cáncer en los ganglios linfáticos y de si este se ha propagado hacia otras partes del cuerpo. Los estadios van del 1 al 4, donde el estadio 4 indica enfermedad metastásica o que el cáncer se propagó desde el hígado hacia otras partes del cuerpo. Los médicos también calculan la puntuación de fibrosis y la clase Child-Pugh, que les informan sobre la salud del hígado y cómo le afecta la enfermedad. Esto les ayuda a decidir si la cirugía o el trasplante son una opción.

Tratamiento del cáncer de hígado

- **Estadio temprano:** Si el cáncer de hígado se detecta precozmente, algunas personas pueden someterse a una cirugía o a un trasplante de hígado. Sin embargo, no todo el mundo puede hacerlo. Algunos pacientes reciben tratamientos antes de la cirugía o el trasplante para controlar el cáncer. Estos pueden incluir procedimientos como la ablación o la embolización.
- **Estadio avanzado:** Si la cirugía no es una opción, siguen existiendo tratamientos. Los pacientes pueden optar por tratamientos locales, como la ablación o la embolización, que se realizan de distintas formas. También existen varias terapias sistémicas. Últimamente, se han aprobado nuevas terapias dirigidas e inmunoterapias para tratar el cáncer de hígado. Los médicos examinan su clase Child-Pugh para determinar si se pueden utilizar estos tratamientos en su caso.



No olvide hablar con el médico sobre su diagnóstico específico y las opciones de tratamiento.